

SILBOS®



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

SILBOS® es un herbicida para el control de malas hierbas anuales (gramíneas y de hoja ancha) en pre- emergencia o post-emergencia precoz, basado en la materia activa pendimetalina. Permite un control de malas hierbas desde el inicio del ciclo de cultivo evitando la competencia de las Malas hierbas con el cultivo durante los primeros estadios.

Nº DE REGISTRO: 25.580

COMPOSICIÓN: Pendimetalina 45,5% (455g/l)

FORMULACIÓN: Suspensión de Cápsulas (CS)

PRESENTACIÓN: Envase de 5L

MODO DE ACCIÓN:

Materia activa	SILBOS
<p>La pendimetalina actúa impidiendo la formación de estructuras proteicas que intervienen en la elongación y la división celular y por lo tanto alterando el crecimiento del sistema radicular y de la parte aérea de la planta, hasta la muerte de las mismas. Aplicado en preemergencia de las adventicias o en postemergencia temprana, como máximo hasta una hoja verdadera, controla numerosas dicotiledóneas anuales de hoja ancha y algunas monocotiledóneas. Entre las especies controladas se citan: <i>Alopecurus myosuroides</i> (cola de zorra), <i>Amaranthus</i> spp.(bledos), <i>Chamomilla recutita</i> (camomila), <i>Chenopodium</i> spp.(cenizos), <i>Digitaria sanguinalis</i> (pata de gallina), <i>Echinochloa crus-galli</i> (grama de agua), <i>Galium aparine</i> (amor del hortelano), <i>Lamium amplexicaule</i> (ortiga muerta), <i>Lolium multiflorum</i> (raigrás italiano), <i>Lolium perenne</i> (raigrás inglés), <i>Salsola kali</i> (capitana), <i>Setaria</i> spp.(almorejos), <i>Solanum nigrum</i> (hierbamora), <i>Urtica</i> spp. (ortigas), <i>Veronica</i> spp. (verónicas), etc.</p>	<p>La formulación de Suspensión Cápsulas de SILBOS optimiza la forma y tiempo de acción de la materia activa. La formulación microencapsulada favorece una mejor distribución en el tanque, en la parcela y la máxima estabilidad en el suelo, se limitan las pérdidas por volatilidad. SILBOS tiene mayor resistencia a la luz solar por su formulación microencapsulada.</p> <p>Además SILBOS es incoloro lo que facilita su manejo (facilidad de limpieza de las herramientas de trabajo) y tiene menos olor que otras formulaciones de pendimetalina. Se mezcla fácilmente con otros herbicidas.</p>

Modo de empleo:

Cultivo	Dosis	Modo de empleo
Ajos	2.5 - 3 L/ha	Aplicar en post-emergencia temprana (1-3 hojas) del cultivo
Alcachofas	2 - 2.5 L/ha	Aplicar antes del trasplante con incorporación o en plantación instalada durante el período de letargo, antes del nuevo desarrollo, en pre-emergencia de las malas hierbas
Algodón	3.6 - 4.3 L/ha	Aplicar en pre-siembra con incorporación al suelo o en pre-emergencia del cultivo
Cebollas de siembra directa	2.5 - 3 L/ha	Aplicar antes del nuevo desarrollo en post-emergencia temprana (1-3 hojas)
Cebollas de trasplante	2.5 - 3 L/ha	Aplicar antes del trasplante con incorporación al suelo
Cítricos	2.5 - 3 L/ha	Aplicación dirigida al suelo entre las líneas de la plantación, en primavera u otoño, en pre-emergencia de las malas hierbas
Fresa	2.5 - 3 L/ha	Aplicar antes del trasplante con incorporación al suelo o en plantación instalada durante el período de letargo, antes del nuevo desarrollo, en pre-emergencia de las malas hierbas
Frutales de pepita	2.5 - 3 L/ha	Aplicación dirigida al suelo entre las líneas de la plantación, durante la parada vegetativa antes de la brotación, en pre-emergencia de las malas hierbas
Frutales de hueso	2.5 - 3 L/ha	Aplicación dirigida al suelo entre las líneas de la plantación, durante la parada vegetativa antes de la brotación, en pre-emergencia de las malas hierbas
Girasol	2.5 - 3 L/ha	Aplicar en pre-emergencia del cultivo
Guisantes verdes	2.5 - 3 L/ha	Aplicar en pre-emergencia del cultivo
Habas, guisantes proteaginosos	2 - 2.5 L/ha	Aplicar en pre-siembra con incorporación al suelo
Lechuga	2.5 - 3 L/ha	Aplicar en pre-trasplante con incorporación al suelo. En variedad Iceberg no sobrepasar 2 l/ha
Maíz	2.5 - 3 L/ha	Aplicar en pre-emergencia del cultivo
Patata	2.5 - 3 L/ha	Aplicar en pre-emergencia del cultivo

Repollo, Coliflor, Brécol	2.5 - 3 L/ha	Aplicar en pre-trasplante con incorporación al suelo
Soja	2.5 - 3 L/ha	Aplicar en pre-emergencia del cultivo

Tabaco	2.5 - 3 L/ha	Aplicar en pre-trasplante con incorporación al suelo
Tomate	2.5 - 3 L/ha	Aplicar en pre-trasplante con incorporación al suelo
Cereales (trigo, cebada, centeno, triticale)	2.5 - 3 L/ha	Aplicar en pre-emergencia del cultivo
Vid	2.5 - 3 L/ha	Aplicación dirigida al suelo entre las líneas de la plantación, durante la parada vegetativa antes de la brotación, en pre-emergencia de las malas hierbas
Zanahoria	2 - 2.5 L/ha	Aplicar en pre-emergencia del cultivo
Arbustos ornamentales (viveros y plantaciones con asiento)	2 - 3 L/ha	Aplicar entre líneas de plantación en pre-emergencia de las malas hierbas

Plazo de seguridad (días): No Procede

MODO DE EMPLEO

Aplicar en pulverización, efectuando un único tratamiento por período vegetativo, evitando mojar las partes verdes de la planta, solamente en cultivos al aire libre.

Si existe la recomendación de proceder a la incorporación del producto **SILBOS®**, esta debe hacerse a una profundidad de 5 a 8 cm. Si se emplean cultivadores de discos o de brazos elásticos, deben regularse estos aperos para trabajar a una profundidad de 8 a 10 cm. Es preferible realizar dos pases cruzados.

Los cultivos de soja, algodón, guisantes, girasol y cultivos trasplantados pueden sembrarse o trasplantarse en cualquier momento después de la aplicación del producto, previa labor profunda del terreno (15-20 cm). La plantación de patata debe hacerse como mínimo 3 meses después de la aplicación del producto, previa labor profunda del terreno (15-20 cm). El resto de cultivos deben ser sembrados/ trasplantados al menos 6 meses después de la aplicación del producto, previa labor profunda del terreno (15-20 cm). La remolacha azucarera se debe plantar como mínimo 10 meses después de la aplicación del producto, previa labor profunda del terreno (15-20 cm).

En caso de mezcla con formulaciones EC, incorporar en primero SILBOS en el tanque,

asegurarse de que esté totalmente diluido en el agua del tanque antes de añadir la formulación EC.

PRECAUCIONES

Consultar con el servicio técnico de UPL Iberia en caso de duda técnica. Uso reservado a aplicadores y agricultores profesionales. Antes de utilizar el producto, léase detenidamente la etiqueta. Respetar las dosis, condiciones y precauciones de uso, leer la etiqueta del producto antes de usarlo. A la hora de realizar un tratamiento, tomar en cuenta las condiciones de su cultivo (tipo de suelo, presión de plaga o enfermedad, variedad, desarrollo vegetativo, estado del cultivo, resistencias) para optimizar el tratamiento. Para limitar la aparición de resistencias, alternar con otros herbicidas con distinto tipo de acción.

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.