HERBICIDA

ETHOFOL 500

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Herbicida sistémico, selectivo, que se absorbe por los brotes emergentes en las gramíneas y por las raíces en las dicotiledóneas. Su empleo está indicado en el control en preemergencia y postemergencia precoz de gramíneas y algunas dicotiledóneas de remolacha azucarera, de mesa y forrajera.

Nº DE REGISTRO: 25.905

COMPOSICIÓN: etofumesato 50% p/v

FORMULACIÓN:

Suspensión concentrada [SC]. Presentada en forma de suspensión concentrada para aplicar en pulverización.

PRESENTACIÓN:

Envase de 5L.

MODO DE ACCIÓN:

Materia activa	**ETHOFOL**
Herbicida sistémico, selectivo, inhibidor de la síntesis de los lípidos; se absorbe por los brotes emergentes en las gramíneas y por las raíces en las dicotiledóneas, con traslocación a las hojas. Impide el crecimiento de los meristemos, retrasa la división celular y limita la formación de la cutícula cerosa. Se le asigna una persistencia de 5-14 semanas según temperatura y humedad del suelo. Se degrada biológicamente en el suelo siendo su vida media inferior a 5 semanas en condiciones húmedas y cálidas, y superior a 14 semanas en condiciones secas y frías. En suelos desnudos es de unos 51 días y en céspedes, 3 días.	Entre las malas hierbas que controla **ETHOFOL®** se encuentran **triguillo** (*Aegilops ovata*), **cola de zorra (***Alopecurus myosuroides),* **balluecas** (*Apera spica-venti, Avena* spp.), **pata de gallina (***Bromus* spp., *Digitaria sanguinalis* **), panissola o viñaruela (***Echinochloa crus-galli* **),** **alpistes (***Phalaris* spp.**), pelosa** (*Poa annua*), **almorejos** *(Setaria* spp.), **rebrotes de trigo**, etc. **y bledos**. (*Amaranthus* spp), **murajes** *(Anagallis arvensis*), **amor del hortelano** *(Galium aparine*), malcoraje *(Mercurialis annua***), verdolaga** *(Portulaca oleracea*), cerraja (*Sonchus oleraceus*), **esparcilla** (*Spergula arvensis*), **pamplina** *(Stellaria media*), etc.

Modo de empleo:

Cultivo	**Malas hierbas**	**Dosis máx. (l/ha)***	**Nºmáx. aplicaciones/año**	**P.S**
Remolacha azucarera (primavera)	*Avena spp.* (Avena), *Alopecurus myosuroides* (Cola de zorra), *Amaranthus retroflexus*	2	1 (pre emergencia)	–
		1 - 1,2	1-3 (post emergencia sin sobrepasar en total los 1,2 l/ha)	

Remolacha azucarera (otoño)	(Bledo), *Anagallis arvensis* (Murajes), *Apera spica-venti (*Ballueca), *Bromus spp*. (Bromo), *Cuscuta spp. (*Cuscuta), *Cynodon dactylon* (Grama), *Cyperus* rotundus (Castañuela), *Digitaria spp*. (Pata de gallina), *Poa annua* (Pelosa), *Portulaca oleracea* (Verdolaga), *Setaria viridis* (Almorejo verde), *Solanum nigrum* (Hierba mora), *Sonchus oleraceus* (Cerraja), *Sorghum halepense* (Sorgo), *Spergula arvensis (*Esparcilla), *Stellaria media* (Pamplina)	2	1 (pre emergencia)	
		1 - 1,5	1-3 (post emergencia sin sobrepasar en total los 1,5 l/ha)	

*No aplicar más de 2 l/ha cada tres años

Consejos de uso y precauciones:

Aplicar mediante pulverización con tractor dirigido al suelo con un caldo de 100 a 500 l/ha. En tratamientos de pre-emergencia, no aplicar este producto en suelos arenosos y con alto contenido en materia orgánica (superior al 5%)

La persistencia del producto en el suelo es de 2 a 3 meses, dependiendo de las condiciones del mismo (temperatura y humedad). Si se emplean dosis altas y el cultivo siguiente a implantar es un cereal, realizar previamente una labor en profundidad hasta 20 cm, volteando completamente la tierra para diluir los posibles residuos existentes. Si por heladas o cualquier otro motivo hay que levantar el cultivo de la remolacha, donde previamente se ha aplicado OBLIX® 500 SC, puede implantarse otro cultivo completamente selectivo a dicho producto, tal como girasol. No tratar con temperaturas superiores a los 25 ºC, o si existen riesgos de heladas. No tratar hierbas mojadas por lluvias o rocío. Las lluvias acaecidas, pasadas las 6 horas de la aplicación, no perjudican la acción del producto aplicado en post-emergencia de acuerdo con las especificaciones de esta etiqueta.

Consultar con el servicio técnico de UPL Iberia en caso de duda sobre mezclas. Almacenar evitando la humedad, y a temperaturas que no estén debajo de -15ºC o más de +40ºC. Uso reservado a aplicadores y agricultores profesionales. Antes de utilizar el producto, léase detenidamente la etiqueta. Respetar las dosis, condiciones y precauciones de uso, leer la etiqueta del producto antes de usarlo. A la hora de realizar un tratamiento, tomar en cuenta las condiciones de su cultivo (tipo de suelo, presión de plaga o enfermedad, variedad, desarrollo vegetativo, estado del cultivo, resistencias) para optimizar el tratamiento. Para limitar la aparición de resistencias, alternar con otros herbicidas con distinto tipo de acción. Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.