

# FAECU® 38

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Cobre en forma de oxiclورو líquido en formulación líquida. Fungicida y bactericida para aplicar en pulverización foliar altamente eficaz en el control preventivo de enfermedades y bacterias en numerosos cultivos. La tecnología DISPERS le proporciona adherencia y elevada resistencia al lavado.

Nº DE REGISTRO: 23.557

COMPOSICIÓN: oxiclورو de cobre 38%

FORMULACIÓN: Suspensión Concentrada (SC)

PRESENTACIÓN: 5L

MODO DE ACCIÓN:



Materias activas	FAECU 38
<p>El oxiclورو de cobre presenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acción preventiva de enfermedades de origen fúngico y bacteriano.</li> <li>• Amplio campo de actividad</li> <li>• Como fungicida es uno de los recursos clásicos en agricultura, es uno de los pocos productos (junto con el azufre) de origen mineral autorizados en agricultura ecológica.</li> </ul>	<p>FAECU 38 es una formulación que se puede mezclar muy fácilmente con otros productos. Esta registrado en numerosos cultivos y controla varias enfermedades y bacteriosis.</p>

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (%)	VOLUMEN CALDO (l/ha)	Nº APLICACIONES	PLAZO SEGURIDAD (días)
Frutales de hueso	Abolladura Bacteriosis Cribado	0,3	800	1 (pre-floración)	No procede
Frutales de pepita	Moteado	0,3	800	1 (pre-floración)	No procede
Olivo	Repilo	0,3	800	2 Intervalo entre aplicaciones 21-25 días	14

<b>Tomate</b> (fresco e industrial)	Alternaria	0,3	600-1000	4	10
	Antracnosis			Intervalo entre aplicaciones 7 días)	
	Mildiu				

### Consejos de uso y precauciones:

En olivar, aplicar desde el estado de “desarrollo de las yemas vegetativas” hasta “aumento de la coloración específica de los frutos” (BBCH 10-85)

Aplicar en pulverización normal a la dosis indicada. Observar precauciones por la fitotoxicidad propia del cobre, sobre todo en zonas frías y húmedas, en algunas variedades de frutales y otros cultivos.

Observar precauciones por la fitotoxicidad propia del cobre, sobre todo en zonas frías y húmedas, en algunas variedades de frutales, vid y otros cultivos.

Consultar con el servicio técnico de UPL Iberia en caso de duda sobre mezclas. Almacenar evitando la humedad, y a temperaturas que no estén debajo de -15°C o más de +40°C. Uso reservado a aplicadores y agricultores profesionales. Antes de utilizar el producto, léase detenidamente la etiqueta. Respetar las dosis, condiciones y precauciones de uso, leer la etiqueta del producto antes de usarlo. A la hora de realizar un tratamiento, tomar en cuenta las condiciones de su cultivo (tipo de suelo, presión de plaga o enfermedad, variedad, desarrollo vegetativo, estado del cultivo, resistencias) para optimizar el tratamiento.

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

UPL IBERIA S.A. Avda. Josep TARRADELLAS 20-30. 08029 Barcelona [es.uplonline.com](http://es.uplonline.com)